

Estudiantes de Medicina- Buenos Aires, Argentina

Encuesta Mundial sobre Profesionales de la Salud (GHPS)

Principales resultados

La encuesta en estudiantes de Medicina realizada en Buenos Aires, Argentina, organizada por la OMS/CDC e implementada por UATA, incluye datos sobre prevalencia de consumo de cigarrillos y otros productos con tabaco, conocimientos y actitudes, exposición a tabaco ambiental, deseos de abandono del consumo y entrenamiento universitario recibido sobre distintas técnicas necesarias para promover el abandono. Esta información puede ser de suma utilidad para desarrollar y monitorear un efectivo programa para el control y prevención del tabaquismo en las Universidades de Buenos Aires, Argentina.

La Encuesta Mundial en Profesionales de la Salud fue llevada a cabo en estudiantes de Medicina de 3° año en 4 Universidades de Buenos Aires (2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 2 en la Provincia de Buenos Aires). La tasa de respuesta de las Universidades fue del 100%, y la tasa de respuesta de los estudiantes fue del 86,4%. Un total de 348 estudiantes participó en la Encuesta Mundial sobre Profesionales de la Salud (GHPS) en Argentina..

Prevalencia

- 66.7% alguna vez probó cigarrillos (varones = 66.6%; mujeres = 66.5%).
- 35.5% fuma cigarrillos actualmente (varones = 33.4%; mujeres = 36.5%).
- 24.1% alguna vez probó cigarros o pipas (varones = 38.8%; mujeres = 14.4%)
- 6.4% fuma actualmente cigarros o pipas (varones = 9.2%; mujeres = 4.5%).
- 61.0% fumó en alguna propiedad de la Universidad durante el último año.
- 50.3% fumó en edificios de la Universidad durante el último año.
- 2.8% fumó cigarros o pipas en alguna propiedad de la Universidad durante el último año.
- 4.2% fumó cigarros o pipas en edificios de la Universidad durante el último año .

Factores que influyen el consumo de tabaco

- 65.4% fueron expuestos al humo de tabaco ambiental en sus hogares. la última semana.
- 91.3% fueron expuestos al humo de tabaco ambiental en espacios públicos, la última semana.
- 69.0% piensa que su Universidad tiene prohibido fumar en sus edificios y Hospitales.
- 78.8% piensa que su Universidad aplica la prohibición de fumar en sus edificios y Hospitales.
- 37.8% piensa que su Universidad tiene prohibido fumar en áreas internas comunes (aulas, pasillos, comedores).
- 65.9% Piensa que su Universidad aplica la prohibición de fumar en áreas internas comunes (aulas, pasillos, comedores).
- 86.5% cree que fumar debería estar prohibido en todos los espacios públicos cerrados.
- 88.8% piensa que la venta a menores debería ser prohibida.
- 69.5% piensa que debería existir una prohibición absoluta de la publicidad para todos los productos con tabaco.
- 62.2% de los fumadores actuales desean abandonar inmediatamente.
- 60.0% de los fumadores actuales han recibido alguna vez ayuda o consejos para dejar de fumar.
- 55.7% recibió capacitación sobre los peligros del consumo de tabaco durante su entrenamiento universitario.

Rol de los profesionales de la salud y capacitación en cesación o abandono

- 61.3% piensa que los profesionales de la salud son un modelo para sus pacientes.
- 98.8% piensa que los profesionales de la salud tienen un rol muy importante dando consejos acerca del abandono a sus pacientes.
- 5.2% recibió capacitación médica formal en técnicas para el abandono durante su entrenamiento universitario.
- 91.3% piensa que los profesionales de la salud deberían recibir capacitación específica sobre tratamientos médico para el abandono.

Casi 4 de cada 10 estudiantes fuman cigarrillos actualmente y 6% fuman cigarros o pipas.

6 de cada 10 estudiantes que fuman desea abandonar.

9 de cada 10 estudiantes están expuestos al humo de tabaco ambiental en espacios públicos.

Casi 9 de cada 10 estudiantes apoyan la prohibición de fumar en todos los espacios públicos.

5% de los estudiantes recibió capacitación para efectuar tratamiento médico a pacientes.

9 de cada 10 estudiantes recibirían con agrado entrenamiento para ayudar a los pacientes con el abandono del tabaco.