

Capítulo 4

Salud general y calidad de vida

Introducción

Los aspectos relacionados con la calidad de vida son cada vez más considerados como resultados sanitarios, en especial en enfermedades no transmisibles con expectativa de vida prolongada.

Además de ser las causas más frecuentes de mortalidad, las enfermedades no transmisibles afectan en forma relevante la calidad de vida relacionada con la salud de las personas que las padecen y de la sociedad en su conjunto, presentando mayor utilización de servicios de salud, y requiriendo la necesidad de cuidado por familiares o instituciones.

Se define como “calidad de vida relacionada con la salud” a la percepción del propio estado de salud por parte de cada entrevistado. Esto es diferente de la evaluación objetiva de discapacidad. La medición de la autopercepción del nivel de salud constituye cada vez más un aspecto a evaluar dentro de los indicadores de salud poblacional y en la evaluación de efectividad de intervenciones, como se mencionó arriba, utilizándose como resultado en la investigación clínica y las evaluaciones económicas. A pesar de ser un indicador sencillo y obtenido por autorreporte, la autopercepción del nivel de salud se relaciona con la mortalidad(1).

Diferentes estudios poblacionales indican que el porcentaje de personas que evalúan su salud como regular o mala es alrededor del 12% en países desarrollados(2). En América Latina, la Encuesta Domiciliaria

de Factores de Riesgo en Brasil reportó un nivel de salud regular o mala en diferentes estados del país de 18,4 a 31% en 2003(3). En Chile, en 2006, una encuesta realizada utilizando el cuestionario SF-36 entre beneficiarios a servicios públicos de salud reportó un puntaje de 60 (en una escala de 0 a 100) en salud general, algo menor

a lo reportado para Estados Unidos(4). En la primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se obtuvieron por primera vez estimaciones nacionales de base poblacional en éste área.

“LA AUTO PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE SALUD SE RELACIONA CON LA MORTALIDAD”

Material y métodos

En esta sección se relevó sobre el estado de salud general a través de la salud autorreportada utilizando la pregunta derivada del cuestionario SF-36, dónde los encuestados categorizaron su salud en excelente, muy buena, buena, regular o mala(5). Se implementó también una sección autoadministrada sobre 5 aspectos de calidad de vida, utilizando la versión validada para Argentina del cuestionario Euroqol-5D(6) (movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión).

Resultados

A nivel nacional en 2009 el 80,8% se refirió a su salud como excelente, muy buena o buena, y el 19,2% la definió

como regular o mala, no observándose cambios significativos en relación a 2005 (80,1% y 19,9% respectivamente). La salud reportada como regular o mala fue más elevada en Formosa (27,8%), Jujuy (26,7%), Santiago del Estero (26,5%) y Misiones (25,8%), y los valores más bajos en Chubut (12,8%), Tierra del Fuego (13,9%), Santa Fe (14,8%) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (14,9%)(Tabla 4.1). Se observó mayor deterioro de la calidad de vida expresadas como regular o mala en las provincias de Chaco (20,6% a 23,4%) y Misiones (23,6% a 25,8%)

En relación al sexo, la salud reportada como regular o mala es mayor en las mujeres a nivel nacional (21,9% vs. 16,3%), siguiendo similar tendencia en todas las provincias (Tabla 4.2).

En relación a la edad, se observó peor calidad de vida a mayor edad. A nivel nacional, solamente el 7,3% de la población entre 18 y 24 años reportó salud regular o mala en comparación con 37,7% en mayores de 65 años. La relación con la edad se mantuvo en todas las provincias (Tabla 4.3).

El nivel educativo y el nivel de salud autorreportada estuvieron asociados. Una mejor salud reportada se vinculó a un mayor nivel educativo (Tabla 4.4). En forma similar, se evidenció una relación directa entre el nivel de ingreso y la valoración del propio estado de salud, observándose mayor frecuencia de salud regular o mala en la población con ingresos entre \$0 y \$600 (28,6%), que en la población con ingreso entre \$600 y \$1500 (14,8%) y la población con ingresos mayores a \$1500 (8,4%) (Tabla 4.5).

En cuanto a los indicadores de calidad de vida del cuestionario Euroqol, a nivel nacional, el 10,9% de la población manifestó presentar problemas de movilidad, con mayores niveles en Jujuy, Tucumán, Mendoza y San Juan (Tabla 4.6). Se observaron mayores problemas de movilidad referidos a mayor edad y en mujeres.

El 2,3% de la población a nivel nacional refirió tener dificultades para el cuidado personal (lavarse, vestirse), con mayores niveles en San Luis, Mendoza, Jujuy y Salta (Tabla 4.7). Las mayores dificultades con el cuidado personal se asociaron a una mayor edad.

En relación a las actividades cotidianas, el 7,4% de la población presentó problemas con mayor afectación en Salta y Tucumán (Tabla 4.8). Al igual que con respecto a la movilidad, la prevalencia del reporte de problemas fue mayor en mujeres y a mayor edad .

El 30,1% refirió presentar dolor o malestar. El reporte de dolor o malestar fue mayor en las provincias de Tucumán y Salta. Se observó mayor reporte de dolor y malestar a mayor edad y en mujeres (Tabla 4.9).

A pesar que no es el objetivo principal de esta herramienta (cuestionario Euroqol 5D), el perfil de ansiedad/depresión resulta ser útil para la vigilancia en salud mental. A nivel nacional, el 19,3% de la población refirió estar ansioso o deprimido. Las provincias con mayor nivel de ansiedad o depresión fueron Mendoza, Salta y Tucumán (Tabla 4.10). Se observó el mismo patrón que para otros aspectos en relación al sexo y la edad.

Conclusiones

Los resultados observados son similares a los de la ENFR 2005. Las asociaciones entre la salud percibida, las actividades cotidianas e indicadores sociodemográficos observadas en la 2° ENFR 2009 son comparables a las ya reportadas en otros países. Al igual que en 2005, en el año 2009 las mujeres presentaron peores niveles de salud percibida, hecho que puede relacionarse con una mayor demanda de servicios de salud por parte de las mujeres, a pesar que en general presentan mayor expectativa de vida y enfermedades de mejor pronóstico, menos severas pero de mayor duración que los hombres(7).

"A NIVEL NACIONAL EN 2009 EL 80,8% SE REFIRIÓ A SU SALUD COMO EXCELENTE, MUY BUENA O BUENA, NO OBSERVÁNDOSE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN RELACIÓN A 2005"

La asociación de la edad y calidad de vida ya ha sido descrita ampliamente por diferentes estudios en países desarrollados e inclusive en América Latina(8). La asociación de la calidad de vida relacionada con la salud, con el ingreso y la educación como indicadores socioeconómicos destaca el rol de los determinantes sociales en el nivel de salud de nuestra población(9,10), además de mostrar también inequidades en su distribución. Entre los años 2005 y 2009, a pesar que no se observaron cambios relevantes a nivel nacional, la brecha entre las poblaciones más y menos favorecidas se acrecentó. Por ejemplo, el grupo de menor ingreso en el 2005 presentaba 3,6 veces peor calidad de vida en relación al grupo de mayor ingreso, mientras que en el 2009 esta relación fue de 4,3 veces.

Las diferencias entre provincias en relación a la calidad de vida y actividades cotidianas podrían deberse a diferencias en la distribución etaria entre las mismas. Sin embargo, algunas provincias sin una edad promedio elevada (como Jujuy o Formosa) presentan un nivel de salud general menor, quizás debido a condiciones socioeconómicas y del sistema de salud. Las diferencias entre provincias también podrían relacionarse con diferencias culturales y de percepción de la salud.

Este tipo de información constituye una forma de identificar nuevas áreas de acción y nuevos indicadores a evaluar más allá de los clásicos indicadores de resultado. Las políticas de promoción y prevención logran no sólo reducir la incidencia de enfermedades, sino retrasar su inicio, generando mayor número de años vividos con mejor calidad de vida, fenómeno denominado compresión de la morbilidad(11).

Además, diferentes intervenciones en enfermedades crónicas, que a veces logran beneficios marginales en la sobrevida, pueden obtener mejorías significativas en indicadores de calidad de vida y status funcional, como por ejemplo los programas de manejo de enfermedades crónicas (en especial en asma(12), enfermedad pulmonar obstructiva crónica(13), diabetes(14), insuficiencia cardíaca(15), programas de rehabilitación(16) y otros tipos de intervenciones. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, y en trabajo conjunto con referentes provinciales, ha comenzado a implementar guías de práctica clínica de prevención cardiovascular, diabetes, tabaquismo y enfermedad renal, que contribuyen a una mejoría en la calidad de vida de estas condiciones.

*"LOS GRUPOS SOCIOECONÓMICOS MÁS DESFAVORECIDOS
REPORTARON PEORES NIVELES DE SALUD AUTOPERCIBIDA"*

Referencias

- 1 Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Michael F. Drummond, Mark J. Sculpher, George W. Torrance, Bernie J. O'Brien, Greg L. Stoddart. Oxford University Press; 3rd edition (August 15, 2005)
- 2 Letherbridge M y cols. Summary health statistics for US adults: National Health Interview Survey: National Center for Health Statistics, 2002 (Vital Health Stat 10, nro 222), 2004.
- 3 Inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos não transmissíveis: Brasil, 15 capitais e Distrito Federal 2002-2003. INCA, 2004.
- 4 Olivares P. Estado de Salud de beneficiarios del sistema de salud de Chile. Disponible en http://www.supersalud.cl/documentacion/569/articles-1062_recurso_1.pdf
- 5 www.sf-36.org
- 6 www.euroqol.org
- 7 Bird C y cols. Gender matters: an integrated model for understanding men's and women's. Social Science Medicine 1999;4:745-755.
- 8 HRQOL measures can help track health as population ages. Chronic Disease Notes & Reports 2003;16(1).
- 9 Mackenbach JP y cols. The determinants of excellent health: different from the determinants of ill-health? International Journal of Epidemiology 1994;23:1273-1281.
- 10 Commission of Social Determinants of Health (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization. Disponible en http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563703_eng.pdf
- 11 Fries JF. Aging, natural death, and the compression of morbidity. N Engl J Med 1980;303:130-135.
- 12 Rance KS, Trent CA. Profile of a primary care practice asthma program: improved patient outcomes in a high-risk population. J Pediatr Health Care. 2005 Jan-Feb;19(1):25-32.
- 13 Taylor SJ, Candy B, Bryar RM, Ramsay J, Vrijhoef HJ, Esmond G, Wedzicha JA, Griffiths CJ. Effectiveness of innovations in nurse led chronic disease management for patients with chronic obstructive pulmonary disease: systematic review of evidence. BMJ. 2005 Sep 3;331(7515):485.
- 14 Lynne D. Diabetes disease management in managed care organizations. Dis Manag. 2004;7(1):47-60.
- 15 GESICA Investigators. Randomised trial of telephone intervention in chronic heart failure: DIAL trial. BMJ. 2005 Aug 20;331(7514):425.
- 16 Taylor RS, Brown A, Ebrahim S, Jolliffe J, Noorani H, Rees K, Skidmore B, Stone JA, Thompson DR, Oldridge N. Exercise-based rehabilitation for patients with coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Med. 2004 May 15;116(10):682-92.

Tabla 4.1: Salud general (regular o mala), comparación 2005–2009 por provincias y regiones (Población: total)

Provincias y Regiones	ENFR 2005	IC 95%		ENFR 2009	IC 95%	
		Inferior	Superior		Inferior	Superior
Buenos Aires	18,5%	16,8%	20,3%	19,6%	18,3%	20,9%
CABA	15,3%	13,3%	17,6%	14,9%	11,8%	18,6%
Córdoba	21,9%	19,2%	24,7%	16,2%	14,2%	18,4%
Entre Ríos	19,6%	17,0%	22,6%	16,4%	14,2%	18,8%
Santa Fe	18,3%	16,2%	20,7%	14,8%	13,0%	16,8%
La Pampa	14,2%	12,1%	16,6%	15,1%	12,8%	17,7%
PAMPEANA Y GBA	18,4%	17,3%	19,5%	17,8%	16,9%	18,8%
Catamarca	23,8%	21,3%	26,4%	25,6%	23,0%	28,4%
Jujuy	35,8%	32,3%	39,4%	26,7%	23,8%	29,7%
La Rioja	25,2%	22,6%	28,1%	20,3%	17,8%	23,0%
Salta	29,2%	26,6%	31,9%	25,8%	23,3%	28,6%
Sgo. del Estero	26,6%	23,8%	29,7%	26,5%	23,6%	29,7%
Tucumán	27,6%	24,6%	30,8%	24,3%	21,7%	27,1%
NOROESTE	28,6%	27,2%	30,1%	25,2%	23,9%	26,4%
Corrientes	20,8%	17,9%	23,9%	20,6%	18,0%	23,6%
Chaco	20,6%	18,0%	23,5%	23,4%	20,7%	26,3%
Formosa	29,3%	25,1%	34,0%	27,8%	24,7%	31,1%
Misiones	23,6%	21,0%	26,4%	25,8%	22,8%	29,0%
NORESTE	22,6%	20,8%	24,4%	23,8%	22,3%	25,3%
Chubut	16,1%	13,5%	19,0%	12,8%	10,6%	15,5%
Neuquén	23,9%	20,3%	27,9%	21,6%	18,0%	25,8%
Río Negro	22,3%	19,1%	25,9%	20,5%	17,3%	24,1%
Santa Cruz	20,9%	18,6%	23,5%	15,3%	13,1%	17,8%
Tierra del Fuego	16,5%	13,7%	19,6%	13,9%	11,8%	16,3%
PATAGONIA	20,6%	19,0%	22,3%	17,9%	16,2%	19,5%
Mendoza	17,7%	15,2%	20,6%	19,8%	17,4%	22,4%
San Juan	24,5%	21,7%	27,6%	23,1%	20,3%	26,1%
San Luis	23,6%	21,4%	26,0%	24,4%	21,7%	27,2%
CUYO	20,3%	18,5%	22,2%	21,4%	19,7%	23,0%
TOTAL	19,9%	19,1%	20,8%	19,2%	18,5%	20,0%

Tabla 4.2: Salud general (regular o mala) según sexo, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

Provincias y Regiones	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Ciudad de Buenos Aires	13,4%	16,1%	14,9%
Buenos Aires	17,1%	21,8%	19,6%
Córdoba	12,1%	19,7%	16,2%
Entre Ríos	14,4%	18,1%	16,4%
La Pampa	14,6%	15,6%	15,1%
Santa Fe	10,8%	18,2%	14,8%
PAMPEANA Y GBA	15,2%	20,2%	17,8%
Catamarca	19,2%	31,5%	25,6%
Jujuy	22,8%	30,2%	26,7%
La Rioja	16,4%	23,8%	20,3%
Salta	24,1%	27,3%	25,8%
Santiago del Estero	21,8%	30,6%	26,5%
Tucumán	18,6%	29,4%	24,3%
NOROESTE	21,0%	28,9%	25,2%
Corrientes	14,9%	25,6%	20,6%
Chaco	22,7%	23,9%	23,4%
Formosa	23,9%	31,0%	27,8%
Misiones	21,3%	29,9%	25,8%
NORESTE	20,2%	26,9%	23,8%
Chubut	11,1%	14,4%	12,8%
Neuquén	17,6%	25,2%	21,6%
Río Negro	15,6%	24,9%	20,5%
Santa Cruz	10,8%	19,7%	15,3%
Tierra del Fuego	11,5%	16,2%	13,9%
PATAGONIA	14,2%	21,2%	17,9%
Mendoza	16,1%	23,0%	19,8%
San Juan	19,5%	26,2%	23,1%
San Luis	20,0%	28,3%	24,4%
CUYO	17,6%	24,6%	21,4%
Total	16,3%	21,9%	19,2%
Aglomerados urbanos	Sexo		
	Varón	Mujer	Total
Gran Buenos Aires	17,3%	22,7%	20,2%
Gran Córdoba	11,9%	20,3%	16,3%
Gran Rosario	9,4%	18,7%	14,4%
Gran Mendoza	16,1%	21,3%	18,8%
Gran Tucumán-Tafi Viejo	16,3%	26,6%	21,7%
Gran La Plata	17,9%	17,6%	17,7%
Mar del Plata-Batán	12,2%	19,2%	16,1%
Resto de los aglomerados	16,5%	21,8%	19,3%

Tabla 4.3: Salud general (regular o mala) según edad, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

Provincias y Regiones	Grupos de edad				
	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Ciudad de Buenos Aires	5,2%	8,0%	14,1%	14,6%	30,8%
Buenos Aires	6,6%	9,4%	15,0%	30,6%	39,0%
Córdoba	6,9%	5,5%	15,3%	20,6%	34,0%
Entre Ríos	6,4%	5,1%	14,1%	22,5%	38,5%
La Pampa	4,8%	3,6%	11,4%	23,8%	34,2%
Santa Fe	4,4%	5,7%	13,1%	22,0%	28,3%
PAMPEANA Y GBA	6,2%	8,1%	14,6%	25,9%	35,7%
Catamarca	9,9%	12,7%	21,1%	45,7%	58,3%
Jujuy	11,1%	15,7%	25,5%	38,4%	56,6%
La Rioja	5,3%	10,8%	23,2%	32,9%	50,3%
Salta	11,5%	15,5%	28,7%	40,9%	41,6%
Santiago del Estero	12,3%	19,2%	26,2%	38,6%	44,1%
Tucumán	12,1%	14,7%	28,4%	38,2%	33,4%
NOROESTE	11,1%	15,2%	26,8%	39,2%	43,5%
Corrientes	6,0%	10,9%	19,9%	33,8%	47,6%
Chaco	12,3%	8,2%	18,9%	43,7%	46,2%
Formosa	14,6%	11,5%	32,3%	36,7%	52,9%
Misiones	12,4%	13,9%	25,8%	45,0%	46,5%
NORESTE	10,7%	11,0%	23,1%	40,1%	47,7%
Chubut	4,2%	3,3%	14,5%	17,4%	32,0%
Neuquén	9,9%	13,4%	21,3%	30,6%	43,8%
Río Negro	5,9%	11,7%	18,9%	29,4%	39,1%
Santa Cruz	9,3%	6,9%	15,2%	21,6%	35,5%
Tierra del Fuego	6,8%	5,8%	10,4%	29,4%	46,6%
PATAGONIA	7,1%	9,0%	17,3%	26,0%	38,4%
Mendoza	7,3%	8,9%	13,9%	29,6%	43,5%
San Juan	5,1%	8,6%	19,3%	41,4%	45,9%
San Luis	9,8%	9,6%	19,4%	39,4%	53,1%
CUYO	7,1%	8,9%	16,3%	33,9%	45,5%
Total	7,3%	9,2%	16,8%	28,7%	37,7%
Aglomerados urbanos					
	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Gran Buenos Aires	7,4%	10,1%	17,1%	29,1%	40,0%
Gran Córdoba	9,0%	2,2%	18,0%	22,2%	35,8%
Gran Rosario	6,9%	5,3%	14,8%	22,5%	24,6%
Gran Mendoza	6,3%	10,2%	14,8%	27,5%	37,8%
Gran Tucumán-Tafi Viejo	13,1%	13,0%	22,9%	34,5%	31,3%
Gran La Plata	5,7%	9,5%	12,8%	26,0%	35,1%
Mar del Plata-Batán	6,7%	7,8%	10,3%	22,1%	30,0%
Resto de los aglomerados	7,3%	9,9%	17,3%	31,4%	40,2%

Tabla 4.4: Salud general (regular o mala) según educación, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

Provincias y Regiones	Nivel educativo		
	Primario incompleto	Primario completo o secundario incompleto	Secundario completo o más
Ciudad de Buenos Aires	45,3%	29,5%	8,4%
Buenos Aires	43,5%	24,6%	9,6%
Córdoba	36,2%	22,0%	7,8%
Entre Ríos	40,0%	18,0%	8,3%
La Pampa	40,5%	14,7%	7,1%
Santa Fe	35,3%	18,5%	7,6%
PAMPEANA Y GBA	41,3%	23,7%	8,8%
Catamarca	43,2%	31,7%	16,9%
Jujuy	58,6%	31,1%	14,2%
La Rioja	45,3%	24,7%	12,8%
Salta	45,6%	34,9%	13,5%
Santiago del Estero	40,5%	33,5%	15,1%
Tucumán	33,1%	30,7%	15,4%
NOROESTE	42,6%	31,8%	14,6%
Corrientes	34,4%	29,4%	9,9%
Chaco	45,5%	25,1%	10,4%
Formosa	46,6%	31,1%	17,0%
Misiones	46,8%	26,8%	13,8%
NORESTE	43,0%	27,6%	11,9%
Chubut	26,5%	15,8%	6,7%
Neuquén	48,6%	24,1%	13,4%
Río Negro	41,9%	21,0%	11,7%
Santa Cruz	37,2%	17,7%	7,4%
Tierra del Fuego	40,3%	19,5%	8,0%
PATAGONIA	39,4%	20,1%	10,1%
Mendoza	42,3%	26,1%	9,6%
San Juan	54,1%	27,9%	11,2%
San Luis	51,0%	26,2%	14,0%
CUYO	46,4%	26,6%	10,6%
Total	41,9%	24,8%	9,7%
Aglomerados urbanos	Nivel educativo		
	Primario incompleto	Primario completo o secundario incompleto	Secundario completo o más
Gran Buenos Aires	45,8%	28,2%	10,1%
Gran Córdoba	36,3%	23,0%	9,5%
Gran Rosario	40,6%	18,0%	7,8%
Gran Mendoza	34,8%	27,2%	10,4%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	29,7%	26,5%	15,6%
Gran La Plata	49,6%	26,4%	9,2%
Mar del Plata-Batán	37,5%	25,6%	6,1%
Resto de los aglomerados	42,6%	24,7%	10,1%

Tabla 4.5: Salud general (regular o mala) según ingreso, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

Provincias y Regiones	Ingreso (\$)			
	0-1750	1750-4000	>4000	Ns/nc
Ciudad de Buenos Aires	30,1%	12,7%	7,6%	11,9%
Buenos Aires	29,7%	15,0%	9,4%	18,0%
Córdoba	26,0%	12,4%	5,5%	14,5%
Entre Ríos	24,3%	11,1%	1,1%	14,2%
La Pampa	24,4%	11,1%	5,8%	13,3%
Santa Fe	22,0%	11,9%	5,7%	13,9%
PAMPEANA Y GBA	28,0%	13,8%	8,0%	16,0%
Catamarca	30,0%	21,4%	17,2%	26,3%
Jujuy	30,4%	22,6%	10,6%	32,6%
La Rioja	22,9%	15,7%	13,8%	29,5%
Salta	33,6%	19,7%	2,3%	19,7%
Santiago del Estero	32,3%	15,0%	14,8%	26,9%
Tucumán	27,7%	22,8%	14,3%	12,9%
NOROESTE	30,1%	20,2%	10,6%	22,5%
Corrientes	24,3%	15,3%	8,5%	22,2%
Chaco	29,6%	15,4%	15,5%	13,7%
Formosa	32,2%	19,4%	15,4%	32,3%
Misiones	32,0%	18,0%	14,1%	18,3%
NORESTE	28,9%	16,6%	13,3%	19,9%
Chubut	17,2%	14,6%	5,8%	12,1%
Neuquén	29,0%	22,1%	11,2%	19,8%
Río Negro	30,6%	17,0%	9,2%	14,2%
Santa Cruz	27,6%	14,8%	11,7%	16,9%
Tierra del Fuego	25,3%	15,9%	10,4%	14,9%
PATAGONIA	26,8%	17,3%	9,5%	16,3%
Mendoza	29,7%	14,3%	7,1%	14,4%
San Juan	30,5%	16,3%	6,8%	26,8%
San Luis	35,4%	16,2%	13,6%	11,9%
CUYO	30,9%	15,1%	8,1%	15,5%
Total	28,6%	14,8%	8,4%	16,5%
Aglomerados Urbanos	Ingreso			
	0-1750	1750-4000	>4000	Ns/nc
Gran Buenos Aires	31,8%	16,4%	10,6%	16,4%
Gran Córdoba	25,6%	14,6%	3,7%	15,9%
Gran Rosario	22,4%	13,0%	1,8%	14,1%
Gran Mendoza	29,2%	13,5%	3,4%	15,0%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	24,1%	22,3%	11,6%	13,6%
Gran La Plata	33,3%	17,1%	5,4%	8,5%
Mar del Plata-Batán	24,7%	11,8%	1,1%	35,6%
Resto de los aglomerados	29,0%	15,0%	9,9%	18,0%

Tabla 4.6: Problemas de movilidad, según edad y sexo, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

Provincias y Regiones	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Ciudad de Buenos Aires	9,2%	9,4%	9,3%	2,4%	2,5%	5,0%	9,4%	27,5%
Buenos Aires	9,6%	12,1%	10,9%	2,0%	3,9%	4,7%	15,9%	33,0%
Córdoba	8,6%	13,1%	11,1%	0,2%	2,4%	6,2%	12,4%	37,2%
Entre Ríos	8,0%	12,8%	10,6%	1,5%	2,1%	5,2%	14,5%	36,1%
La Pampa	8,2%	10,6%	9,5%	2,3%	1,8%	4,5%	10,3%	33,2%
Santa Fe	8,8%	12,5%	10,8%	2,4%	2,0%	3,9%	15,4%	32,6%
PAMPEANA Y GBA	9,3%	11,9%	10,7%	1,8%	3,2%	4,8%	14,5%	32,7%
Catamarca	9,9%	15,7%	12,9%	2,5%	5,7%	7,5%	21,2%	49,0%
Jujuy	9,9%	16,0%	13,1%	2,7%	4,8%	10,4%	18,6%	42,7%
La Rioja	7,1%	11,6%	9,4%	1,0%	4,2%	7,6%	15,3%	38,2%
Salta	10,8%	13,7%	12,4%	2,2%	4,3%	8,3%	23,5%	37,9%
Santiago del Estero	7,9%	13,4%	10,9%	1,2%	5,1%	7,2%	17,5%	33,9%
Tucumán	11,1%	16,2%	13,8%	3,4%	5,5%	10,8%	24,5%	38,6%
NOROESTE	10,0%	14,8%	12,5%	2,4%	4,9%	9,1%	21,5%	38,9%
Corrientes	7,0%	15,6%	11,6%	1,5%	5,9%	9,1%	18,3%	36,7%
Chaco	6,9%	12,6%	9,9%	1,4%	1,9%	7,8%	16,2%	34,5%
Formosa	8,1%	10,4%	9,3%	3,5%	1,9%	5,3%	13,9%	34,5%
Misiones	8,5%	10,8%	9,7%	2,0%	2,8%	8,3%	19,4%	29,3%
NORESTE	7,5%	12,7%	10,3%	1,9%	3,4%	8,0%	17,3%	34,1%
Chubut	6,4%	8,0%	7,2%	1,0%	1,9%	3,5%	11,1%	27,9%
Neuquén	6,7%	12,6%	9,9%	1,3%	5,1%	6,1%	15,3%	34,4%
Río Negro	8,5%	12,4%	10,5%	2,9%	3,2%	6,6%	15,4%	30,4%
Santa Cruz	6,2%	7,4%	6,8%	1,4%	3,1%	3,8%	11,1%	26,1%
Tierra del Fuego	3,4%	7,3%	5,4%	2,2%	2,1%	5,0%	5,9%	32,4%
PATAGONIA	6,9%	10,5%	8,7%	1,7%	3,3%	5,3%	13,3%	30,4%
Mendoza	11,1%	14,9%	13,2%	4,8%	3,7%	7,8%	19,0%	34,9%
San Juan	10,1%	15,8%	13,2%	2,7%	2,8%	8,0%	22,7%	35,1%
San Luis	10,7%	14,7%	12,8%	1,1%	1,8%	8,1%	21,3%	40,9%
CUYO	10,8%	15,1%	13,1%	3,7%	3,2%	7,9%	20,2%	35,8%
Total	9,2%	12,4%	10,9%	2,0%	3,4%	5,7%	15,6%	33,4%
Aglomerados Urbanos	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Gran Buenos Aires	9,9%	11,7%	10,8%	2,4%	4,0%	5,1%	15,3%	32,4%
Gran Córdoba	9,7%	11,4%	10,6%	0,0%	2,2%	6,4%	12,0%	41,2%
Gran Rosario	8,8%	13,0%	11,0%	3,4%	2,5%	5,3%	16,1%	34,8%
Gran Mendoza	11,5%	14,4%	13,0%	6,1%	3,2%	6,7%	19,2%	33,6%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	12,7%	16,5%	14,7%	4,7%	6,0%	10,6%	24,1%	43,4%
Gran La Plata	6,1%	16,5%	11,7%	4,1%	2,7%	4,8%	16,5%	32,5%
Mar del Plata-Batán	11,0%	10,8%	10,9%	3,0%	3,0%	4,5%	10,0%	33,1%
Resto de los aglomerados	8,5%	12,6%	10,7%	1,4%	3,1%	6,0%	15,9%	33,1%

Tabla 4.7: Problemas en el cuidado personal, según edad y sexo, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

Provincias y Regiones	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Ciudad de Buenos Aires	1,1%	1,8%	1,5%	0,0%	0,6%	1,9%	1,8%	2,4%
Buenos Aires	1,8%	2,6%	2,2%	0,8%	0,6%	0,6%	2,5%	8,1%
Córdoba	1,2%	3,5%	2,4%	0,4%	1,0%	1,4%	2,1%	8,1%
Entre Ríos	1,3%	3,9%	2,7%	0,0%	0,6%	1,4%	1,9%	11,9%
La Pampa	2,0%	2,5%	2,3%	0,6%	0,0%	1,7%	0,9%	9,5%
Santa Fe	1,9%	2,6%	2,3%	0,0%	0,3%	1,4%	2,8%	7,2%
PAMPEANA Y GBA	1,6%	2,6%	2,2%	0,5%	0,6%	1,0%	2,4%	7,3%
Catamarca	1,6%	4,0%	2,9%	0,4%	0,2%	1,7%	4,2%	14,6%
Jujuy	1,5%	5,1%	3,4%	1,1%	0,5%	1,1%	5,1%	15,4%
La Rioja	1,4%	2,5%	2,0%	0,2%	0,8%	0,7%	1,4%	14,3%
Salta	2,8%	3,3%	3,1%	0,6%	2,7%	0,7%	5,2%	10,4%
Santiago del Estero	1,1%	3,2%	2,2%	0,0%	0,8%	1,3%	2,4%	9,9%
Tucumán	1,6%	4,2%	2,9%	0,8%	1,0%	1,3%	6,4%	8,4%
NOROESTE	1,8%	3,8%	2,9%	0,6%	1,3%	1,1%	4,8%	11,0%
Corrientes	1,5%	2,7%	2,1%	1,6%	0,0%	1,6%	3,0%	7,5%
Chaco	1,6%	2,7%	2,2%	0,5%	0,4%	1,5%	1,5%	11,4%
Formosa	1,5%	3,5%	2,6%	0,4%	0,3%	1,4%	3,7%	11,5%
Misiones	1,4%	1,5%	1,5%	0,0%	0,2%	2,2%	0,8%	7,1%
NORESTE	1,5%	2,5%	2,1%	0,7%	0,2%	1,7%	2,1%	9,3%
Chubut	1,6%	1,7%	1,6%	0,0%	0,0%	1,4%	2,2%	6,8%
Neuquén	2,1%	3,8%	3,0%	2,6%	1,0%	0,2%	4,4%	11,7%
Río Negro	2,1%	2,3%	2,2%	0,0%	1,1%	1,4%	4,0%	5,5%
Santa Cruz	1,2%	1,9%	1,5%	1,1%	0,3%	1,1%	2,3%	5,2%
Tierra del Fuego	0,3%	0,8%	0,6%	0,4%	0,0%	0,6%	0,0%	5,5%
PATAGONIA	1,7%	2,4%	2,1%	0,9%	0,6%	1,0%	3,2%	7,3%
Mendoza	2,6%	3,7%	3,2%	0,0%	0,3%	2,2%	4,3%	10,3%
San Juan	1,3%	3,2%	2,3%	0,0%	0,0%	2,0%	3,3%	7,3%
San Luis	4,2%	4,3%	4,2%	1,5%	0,7%	2,4%	4,2%	16,3%
CUYO	2,5%	3,7%	3,1%	0,2%	0,3%	2,2%	4,1%	10,4%
Total	1,7%	2,8%	2,3%	0,5%	0,6%	1,1%	2,7%	7,9%
Aglomerados urbanos	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Gran Buenos Aires	1,4%	2,2%	1,9%	0,8%	0,4%	0,8%	2,4%	5,9%
Gran Córdoba	0,8%	2,5%	1,7%	0,7%	1,2%	1,7%	0,7%	4,9%
Gran Rosario	1,8%	2,6%	2,2%	0,0%	0,3%	2,5%	1,9%	7,6%
Gran Mendoza	2,6%	4,4%	3,6%	0,0%	0,4%	2,7%	5,5%	10,2%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	1,2%	4,6%	3,0%	1,2%	1,2%	0,9%	5,7%	9,9%
Gran La Plata	0,7%	4,3%	2,7%	0,0%	1,4%	1,2%	5,2%	5,5%
Mar del Plata-Batán	1,2%	2,8%	2,1%	2,0%	0,0%	0,3%	2,7%	5,5%
Resto de los aglomerados	2,0%	3,0%	2,6%	0,3%	0,7%	1,2%	2,9%	9,8%

Tabla 4.8 Problemas en las actividades cotidianas, según edad y sexo, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

PProvincias y Regiones	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Ciudad de Buenos Aires	3,9%	5,4%	4,7%	2,0%	1,0%	2,9%	4,3%	13,7%
Buenos Aires	5,9%	8,4%	7,2%	2,0%	3,0%	3,9%	9,7%	20,4%
Córdoba	6,7%	10,9%	9,0%	0,6%	3,6%	4,9%	10,8%	27,2%
Entre Ríos	7,2%	11,0%	9,3%	3,9%	2,4%	4,3%	10,7%	31,1%
La Pampa	5,0%	8,2%	6,7%	1,2%	2,2%	3,6%	8,3%	20,7%
Santa Fe	5,1%	7,8%	6,6%	2,1%	1,6%	4,5%	8,2%	17,0%
PAMPEANA Y GBA	5,7%	8,3%	7,1%	1,9%	2,6%	3,9%	8,9%	20,1%
Catamarca	5,9%	13,1%	9,7%	1,6%	2,2%	6,6%	17,8%	35,6%
Jujuy	6,7%	11,9%	9,4%	4,5%	2,7%	5,6%	15,4%	29,1%
La Rioja	4,4%	6,6%	5,6%	0,5%	1,3%	4,6%	7,5%	28,6%
Salta	7,8%	12,7%	10,4%	3,7%	4,8%	9,4%	16,6%	26,3%
Santiago del Estero	4,6%	11,9%	8,6%	0,4%	6,4%	8,1%	12,6%	20,0%
Tucumán	6,1%	13,6%	10,1%	2,5%	6,0%	8,9%	18,0%	21,1%
NOROESTE	6,3%	12,4%	9,5%	2,6%	4,6%	7,9%	15,8%	24,9%
Corrientes	6,2%	10,3%	8,4%	2,4%	3,5%	4,4%	15,1%	27,9%
Chaco	5,8%	8,3%	7,1%	2,8%	0,4%	7,1%	11,2%	20,8%
Formosa	3,8%	7,5%	5,8%	0,9%	1,7%	3,5%	8,7%	22,1%
Misiones	6,5%	9,8%	8,2%	2,0%	3,9%	10,1%	13,3%	16,2%
NORESTE	5,8%	9,1%	7,6%	2,2%	2,5%	6,6%	12,5%	22,3%
Chubut	4,0%	6,8%	5,5%	0,3%	2,5%	3,3%	8,1%	19,0%
Neuquén	5,0%	9,1%	7,2%	3,6%	2,5%	6,1%	9,4%	21,8%
Río Negro	5,1%	8,6%	7,0%	0,8%	3,0%	5,1%	11,3%	16,8%
Santa Cruz	3,6%	5,5%	4,6%	1,5%	1,1%	4,2%	8,2%	12,7%
Tierra del Fuego	1,8%	4,5%	3,2%	1,2%	1,0%	3,5%	2,9%	20,5%
PATAGONIA	4,4%	7,7%	6,1%	1,6%	2,3%	4,7%	9,1%	18,3%
Mendoza	4,3%	10,5%	7,6%	2,3%	1,4%	2,9%	11,0%	23,8%
San Juan	6,1%	13,0%	9,8%	2,9%	1,9%	8,3%	18,5%	20,0%
San Luís	7,2%	9,9%	8,7%	2,1%	1,9%	7,9%	13,4%	22,1%
CUYO	5,2%	11,1%	8,3%	2,4%	1,6%	5,2%	13,1%	22,6%
Total	5,7%	8,9%	7,4%	2,1%	2,8%	4,7%	10,1%	20,7%
Aglomerados urbanos	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Gran Buenos Aires	5,8%	7,9%	6,9%	2,6%	2,9%	3,7%	9,1%	19,0%
Gran Córdoba	7,4%	10,4%	9,0%	1,1%	3,1%	6,3%	13,7%	25,1%
Gran Rosario	6,3%	7,3%	6,9%	3,2%	1,9%	7,9%	6,4%	17,4%
Gran Mendoza	5,0%	9,4%	7,3%	2,5%	1,7%	2,6%	10,3%	21,9%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	6,8%	13,3%	10,3%	1,6%	7,0%	9,1%	16,6%	23,5%
Gran La Plata	5,0%	8,0%	6,6%	0,0%	0,4%	3,1%	9,6%	21,3%
Mar del Plata-Batán	5,1%	8,3%	6,9%	0,9%	4,2%	3,3%	11,5%	12,4%
Resto de los aglomerados	5,4%	9,6%	7,7%	1,8%	2,6%	5,0%	10,6%	22,2%

Tabla 4.9 Dolor/Malestar, según edad y sexo, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

Provincias y Regiones	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Ciudad de Buenos Aires	21,0%	32,0%	27,0%	16,9%	15,4%	24,4%	31,7%	45,4%
Buenos Aires	24,4%	34,3%	29,6%	13,3%	17,8%	24,7%	41,2%	54,6%
Córdoba	25,7%	35,1%	30,9%	11,2%	13,8%	30,5%	43,4%	55,3%
Entre Ríos	22,7%	28,4%	25,7%	9,6%	14,5%	25,2%	30,4%	53,6%
La Pampa	25,7%	31,0%	28,5%	12,0%	15,4%	26,2%	37,5%	53,8%
Santa Fe	22,9%	36,0%	30,0%	12,8%	20,5%	22,9%	42,2%	52,2%
PAMPEANA Y GBA	23,9%	34,0%	29,3%	13,3%	17,1%	25,1%	39,8%	52,9%
Catamarca	28,4%	38,7%	33,8%	14,1%	21,0%	34,8%	51,6%	64,4%
Jujuy	30,5%	39,9%	35,4%	16,7%	21,9%	37,7%	49,6%	63,7%
La Rioja	19,3%	33,2%	26,5%	14,1%	18,7%	27,1%	34,4%	61,4%
Salta	32,2%	41,2%	37,0%	20,7%	24,9%	39,8%	52,9%	59,1%
Santiago del Estero	27,2%	38,7%	33,4%	16,2%	27,0%	34,5%	39,3%	60,3%
Tucumán	29,6%	44,8%	37,6%	20,8%	30,1%	37,7%	51,8%	58,4%
NOROESTE	29,3%	41,0%	35,5%	18,5%	25,7%	36,8%	48,9%	60,3%
Corrientes	28,9%	33,9%	31,6%	18,2%	21,7%	32,6%	43,8%	54,1%
Chaco	27,0%	32,9%	30,1%	17,6%	18,6%	28,7%	41,7%	57,4%
Formosa	25,7%	33,3%	29,9%	12,0%	18,2%	35,3%	36,9%	55,5%
Misiones	24,1%	32,3%	28,3%	15,0%	17,8%	29,3%	46,9%	43,7%
NORESTE	26,6%	33,1%	30,1%	16,3%	19,3%	30,9%	42,9%	53,2%
Chubut	19,2%	26,8%	23,2%	7,2%	12,4%	26,0%	30,1%	49,0%
Neuquén	19,9%	32,2%	26,4%	16,4%	15,3%	26,9%	33,7%	52,9%
Río Negro	22,8%	34,3%	28,8%	14,3%	18,1%	26,6%	37,5%	52,0%
Santa Cruz	16,2%	29,9%	23,1%	13,4%	16,2%	22,9%	29,8%	45,8%
Tierra del Fuego	18,7%	25,3%	22,1%	12,5%	13,2%	24,5%	30,7%	53,8%
PATAGONIA	20,1%	30,8%	25,7%	12,9%	15,3%	25,9%	33,4%	50,9%
Mendoza	29,1%	40,9%	35,4%	14,3%	20,5%	34,9%	47,6%	63,3%
San Juan	24,8%	40,6%	33,3%	12,6%	23,5%	29,9%	49,2%	54,7%
San Luis	23,9%	41,4%	33,2%	21,6%	18,8%	30,7%	47,3%	54,7%
CUYO	27,2%	40,9%	34,5%	15,0%	20,9%	32,8%	47,9%	59,8%
Total	24,7%	34,9%	30,1%	14,3%	18,4%	27,3%	41,1%	53,9%
Aglomerados urbanos	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Gran Buenos Aires	25,0%	35,4%	30,6%	16,3%	18,1%	26,7%	40,8%	54,4%
Gran Córdoba	30,4%	37,3%	34,0%	15,7%	14,8%	37,0%	49,6%	58,6%
Gran Rosario	22,2%	36,8%	30,1%	12,8%	25,5%	22,8%	44,1%	49,7%
Gran Mendoza	29,3%	39,2%	34,5%	15,4%	19,7%	33,3%	47,0%	60,4%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	29,0%	43,8%	36,8%	19,7%	31,4%	32,5%	50,2%	62,7%
Gran La Plata	15,8%	32,0%	24,5%	5,8%	12,9%	19,9%	34,0%	50,3%
Mar del Plata-Batán	19,4%	35,3%	28,2%	11,3%	13,3%	19,3%	36,9%	54,3%
Resto de los aglomerados	24,3%	33,7%	29,3%	12,9%	18,1%	27,3%	40,2%	52,8%

Tabla 4.10: Ansiedad/Depresión, según edad y sexo, por provincias, regiones y aglomerados urbanos (Población: total)

Provincias y Regiones	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Ciudad de Buenos Aires	17,4%	20,8%	19,2%	20,1%	11,1%	19,2%	23,4%	22,7%
Buenos Aires	15,8%	21,6%	18,9%	12,4%	12,5%	18,4%	26,0%	25,2%
Córdoba	17,7%	25,8%	22,1%	14,4%	14,7%	24,1%	26,0%	30,6%
Entre Ríos	12,2%	15,9%	14,2%	5,9%	8,9%	13,6%	18,7%	25,0%
La Pampa	9,8%	13,6%	11,8%	4,2%	9,6%	14,4%	11,4%	19,1%
Santa Fe	13,3%	19,8%	16,8%	10,2%	13,3%	18,0%	22,0%	19,1%
PAMPEANA Y GBA	15,8%	21,5%	18,8%	13,0%	12,5%	18,8%	24,8%	24,6%
Catamarca	14,7%	24,2%	19,7%	16,0%	15,6%	18,3%	24,4%	31,0%
Jujuy	19,8%	28,2%	24,2%	15,1%	17,5%	25,2%	32,7%	35,5%
La Rioja	9,8%	19,9%	15,1%	12,9%	13,4%	17,3%	10,4%	27,4%
Salta	22,9%	29,7%	26,5%	22,0%	19,5%	29,6%	31,4%	34,2%
Santiago del Estero	11,7%	20,1%	16,2%	7,9%	14,1%	16,2%	24,2%	20,8%
Tucumán	20,1%	29,6%	25,1%	17,0%	22,0%	27,4%	31,2%	30,3%
NOROESTE	18,5%	27,0%	23,0%	16,4%	18,5%	24,6%	28,6%	30,5%
Corrientes	16,8%	25,7%	21,6%	15,9%	16,8%	21,4%	27,4%	32,6%
Chaco	11,6%	15,0%	13,4%	8,5%	7,9%	15,5%	15,6%	24,2%
Formosa	12,1%	17,6%	15,1%	6,3%	11,2%	18,8%	17,0%	24,5%
Misiones	12,6%	21,4%	17,2%	12,0%	14,6%	17,3%	22,1%	24,9%
NORESTE	13,5%	20,2%	17,1%	11,4%	12,9%	18,2%	20,8%	27,1%
Chubut	10,2%	12,5%	11,4%	2,6%	6,5%	14,7%	16,7%	16,9%
Neuquén	11,9%	19,3%	15,8%	9,9%	14,9%	14,4%	19,4%	24,8%
Río Negro	8,7%	19,6%	14,4%	11,1%	9,9%	14,4%	19,0%	17,9%
Santa Cruz	9,4%	18,4%	14,0%	16,0%	10,8%	14,2%	12,7%	19,9%
Tierra del Fuego	7,1%	15,9%	11,6%	8,2%	9,6%	11,9%	15,9%	17,7%
PATAGONIA	9,9%	17,4%	13,8%	9,1%	10,5%	14,2%	17,7%	19,5%
Mendoza	23,2%	31,3%	27,5%	17,7%	21,5%	26,0%	35,2%	38,4%
San Juan	16,3%	27,0%	22,0%	18,6%	16,6%	20,2%	30,2%	26,1%
San Luís	13,7%	25,8%	20,1%	11,7%	17,3%	21,3%	23,2%	28,0%
CUYO	19,9%	29,3%	24,9%	17,0%	19,5%	23,7%	32,2%	33,7%
Total	15,9%	22,3%	19,3%	13,3%	13,6%	19,4%	25,0%	25,6%
Aglomerados urbanos	Sexo			Grupos de edad				
	Varón	Mujer	Total	18-24 años	25-34 años	35-49 años	50-64 años	65 y +
Gran Buenos Aires	17,1%	22,7%	20,1%	15,1%	12,0%	20,1%	27,0%	26,7%
Gran Córdoba	19,3%	30,8%	25,4%	18,8%	16,0%	28,5%	30,5%	35,2%
Gran Rosario	15,3%	19,9%	17,8%	8,8%	19,2%	19,9%	19,5%	20,6%
Gran Mendoza	22,7%	33,0%	28,2%	18,0%	22,6%	29,3%	34,4%	37,3%
Gran Tucumán-Tafí Viejo	20,4%	28,5%	24,7%	13,6%	22,3%	27,0%	29,9%	34,2%
Gran La Plata	16,3%	21,5%	19,1%	6,9%	14,9%	18,5%	37,3%	15,5%
Mar del Plata-Batán	22,0%	28,9%	25,8%	19,7%	21,1%	22,0%	31,3%	32,3%
Resto de los aglomerados	13,8%	20,3%	17,2%	11,7%	12,8%	17,4%	21,8%	23,5%