

FLUJOGRAMA DE MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS DE HANTAVIRUS

Hantavirus: Caso sospechoso

- Paciente de cualquier edad y sexo que presente fiebre mayor de 38° C sin foco acompañado de alguno de los siguientes: mialgias, escalofríos, astenia, cefalea o dolor abdominal.
- Paciente que presente Neumonía Aguda de la Comunidad precedida por pródromos, trombocitopenia y/o inmunocitos.

EVALUAR EL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO

- Antecedentes de riesgo: residencia o excursiones a áreas rurales.
 - Contacto con roedores silvestres su orina o deposiciones.
 - Haber realizado tareas de desmalezamiento, limpieza de casas deshabitadas o bodegas.
- La ausencia de riesgo no debe descartar la sospecha diagnóstica**

BAJO RIESGO

24 hs de observación. Investigar otras causas

RESULTADOS NEGATIVOS

- 24 hs de observación
- Repetir evaluación

- Tomar muestra para diagnóstico en forma precoz, incluyendo suero y coágulo
- Notificar en forma inmediata
- Realizar la investigación epidemiológica.
- Aplicar las medidas de control e intervención ambiental en el lugar probable de exposición (familiar, laboral o recreacional)

ALTO RIESGO

Solicitar hemograma, Rx tórax

- Saturación de O₂ < 90%
- Hematocrito elevado
- Trombocitopenia
- Leucocitosis con desviación a la izquierda, linfocitos atípicos
- Infiltrados pulmonares

Hospitalizar en establecimiento con acceso a Unidad de Cuidados intensivos.