

VIH y sida en Argentina



70% conoce su diagnóstico
84 mil personas

30% desconoce su diagnóstico
36 mil personas



7 de cada 10 se atienden en el sistema público

Prevalencia de VIH



Algunas acciones implementadas por la Dirección de Sida y ETS en 2015

350 LUGARES DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN TODO EL PAÍS.



600

CENTROS DE TESTEO ACTIVOS CON ASESORAMIENTO.



4044

PUESTOS FIJOS DE ENTREGA DE PRESERVATIVOS Y GELES LUBRICANTES



21 CONSULTORIOS AMIGABLES PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL FUNCIONANDO EN TODO EL PAÍS.

CASI **1700** RESPUESTAS A CONSULTAS Y PROBLEMAS DERIVADOS DE OBRAS SOCIALES.

5 NUEVAS INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES

- SEROPREVALENCIA DE VIH, SÍFIS, HEPATIS VIRALES Y TUBERCULOSIS EN CÁRCELES.
- CASCADA DEL CONTINUO DE LA ATENCIÓN DEL VIH.
- ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES.
- RESISTENCIA PRIMARIA A LOS ANTIRRETROVIRALES.
- ESTUDIO DE CASOS DE NIÑOS/AS CON VIH POR TRANSMISIÓN PERINATAL.



CASI **7000** PREGUNTAS RESPONDIDAS EN LA LÍNEA 0800 3333 444



ENCUENTRO NACIONAL DE DEBATE POR LA REFORMA DE LA LEY DE SIDA.

Síntesis

Boletín sobre el VIH-sida

Nº 33 en la Argentina

AÑO XIX - DICIEMBRE DE 2016

En todo el país
6.500
casos notificados por año

Cada 100.000 habitantes, se notifican
13,5
personas con diagnóstico de VIH
2013-2014


Diagnósticos por sexo

●●● Varones **2,1**
● Mujeres **1**


Mediana de edad de diagnóstico

● Varones **33 años**
● Mujeres **32 años**


En AMBA
En los últimos diez años, descendió la concentración de nuevos diagnósticos en relación al total del país.



5,2 de cada 100 bebés de madres con VIH son diagnosticados con el virus



Tasa de diagnóstico de VIH por 100.000 habitantes según región y sexo 2013-2104



Defunciones por sida
Cada 100.000 habitantes, 2014

●●●●● 3,4 ambos sexos
●●●●● 4,6 varones
●●● 2,3 mujeres

Vías de transmisión



de las infecciones se producen por relaciones sexuales sin protección
2013-2015


En varones

Relaciones sexuales con varones	46,9%
Relaciones sexuales con mujeres	43,2%
Transmisión perinatal	1,0%
Uso de drogas inyectables	0,7%
Desconocido	8,2%

En mujeres

Relaciones sexuales con varones	90,6%
Transmisión perinatal	2,7%
Uso de drogas inyectables	0,2%
Desconocido	6,4%

Diagnósticos tardíos 2012-2015



Diagnósticos que se realizan en una etapa avanzada de la infección

